

# INFLUENZAPANDEMIE

## Merkblatt für medizinisches Fachpersonal

### 1. Klinische Influenzadiagnose

Kriterien	Influenza $\approx$ 90% Sensitivität/Spezifität
Influenza in der Region	✓
Plötzliche Erkrankung	✓
Fieber $>$ 38°C	✓
+ zwei der folgenden Symptome:	
Muskel- und Gliederschmerzen	Husten
Müdigkeit und Abgeschlagenheit	Heiserkeit
Kopfschmerzen	Bettlägerigkeit

### 2. Krankenhauseinweisung

Schweregradbestimmung: Triagekriterien entsprechend dem **VAB-65** Score (Verwirrung, Atemfrequenz, Blutdruck, 65 Lebensjahre)

Schweregradbestimmung	Punkte
Verwirrung (zeitliche, örtliche und zur Person Desorientierung)	1 Punkt
Atemfrequenz $>$ 30 pro Minute	1 Punkt
Blutdruck systolisch $<$ 90 mm/Hg oder diastolisch $<$ 60 mm/Hg	1 Punkt
Lebensalter $>$ 65 Jahre	1 Punkt

#### Ergebnis und Bedeutung:

Bei Testscoreergebnissen von 0 und 1 Punkten ist eine ambulante Behandlung der Influenza anzustreben. (Sterblichkeit  $<$  5-10%)

Bei Testscoreergebnissen von 2, 3 oder 4 Punkten ist eine stationäre Aufnahme notwendig. (Sterblichkeit  $>$  5-10%)

**3. Therapie:** Bettruhe, Volumen-Elektrolyttherapie, Tamiflu 2x75mg p.o. bei Dauer der Symptome  $<$ 48h, Paracetamol 3x500/die und Antibiotika bei Verdacht auf bakterielle Superinfektionen: (z.B.: Amoxicillin/Clavulansäure 2 x1g, Cefuroxim-Axetil 2x500mg, evtl. in Kombination mit einem Makrolid; Chinolon bei Penicillinallergie), symptomatisch Antitussiva, Antiobstruktiva

#### **Für den Inhalt verantwortlich:**

Dr. Susanne Drapalik, OÄ Dr. Agnes Wechsler-Fördös, Präs. Mag. pharm. Heinrich Burggasser, MR Dr. Rolf Jens, Univ.-Prof. Dr. Christoph Wenisch

#### **Referenzen:**

Lim, et al. Thorax 2003; 58:377-382;  
 Hoffgen G, et al Pneumologie. 2005;59(9):e1-e63  
 Clinicum, Sonderausgabe 10/2003