


Limnologische Badegewässeruntersuchungen – Bericht für 2023

Phytoplanktonbiomassen [g/m³] an der Seeoberfläche in den Jahren 1992 bis 2023

Mittelwerte (mit Angabe der jeweiligen Minimums- und Maximumswerte) bzw. Einzelwerte
2007: Achensee, Heiterwanger See, Plansee: Mischproben

(Seen alphabetisch geordnet)




Limnologische Badegewässeruntersuchungen – Bericht für 2023

Sichttiefen [m] in den Jahren 1992 – 2023

Mittelwerte (mit Angabe der jeweiligen Minimums- und Maximumswerte) bzw. Einzelwerte

(Seen alphabetisch geordnet)



Gesamtphosphor-Konzentrationen (TP im Rohwasser, µg/l) in den Proben der Seeoberfläche in den Jahren 2003 – 2023

Mittelwerte (mit Angabe der jeweiligen Minimums- und Maximumswerte) bzw. Einzelwerte

(Seen alphabetisch geordnet)

Bei Gesamt-Phosphor-Konzentrationen, die geringer als die Bestimmungsgrenze sind (=3µg/l), wird für die Berechnung des Mittelwertes der halbe Wert der Bestimmungsgrenze (1.5µg/l) verwendet. Liegt die Konzentration unter der Nachweisbarkeitsgrenze von 0.8µg/l, wird dieser Wert verwendet.

